



Как да използвате Вашия инхалатор дозир-аерозол?



- 1.** Сваля се предпазното капаче на мундшука и се проверява дали е чист, без прах, замърсяване или чужди тела.



- 2.** Издишва се възможно по-дълбоко и по-бавно, като се задържа флакона в изправено положение.



- 3.** Поставя се мундшука в устата и плътно се обхваща с устни. Докато се вдишва бавно и дълбоко, се натиска инхалатора отгоре, за да се възпроизведе впръскване.



- 4.** Задържа се вдишването възможно по-дълго. След това инхалатора се изважда от устата и се издишва бавно. Не се издишва в инхалатора.

- Ако се налага да се направи още едно впръскване, се задържа инхалатора в изправено положение за около половин минута и се повтаря стъпка от 2 до 4.
- След употреба се поставя предпазната капачка.
- Важно е да не се изпълняват твърде бързо стъпки от 2 до 4.
- Препоръчително е изплакване на устата или измиване на зъбите след използване на инхалатора.



За какво се използва този инхалатор?



● Тъй като този дозир-аерозол е разтвор, няма нужда от предварително разклащане.

Вашият инхалатор е разтвор под налягане за инхалация през устата, съдържащ две активни вещества, които се доставят директно до белите дробове. Комбинацията от тези вещества улеснява дишането, осигурявайки облекчение на симптоми като задух, хрипове и кашлица при пациенти с астма и ХОББ, като подпомагат предотвратяването на появата на симптоми на астма.

Астма: Показан за лечение на астма при възрастни пациенти, при които:

- астмата не е адекватно контролирана чрез употреба на инхалаторни кортикостероиди и/или от краткодействащи бронходилататори, използвани "при нужда".

- Астмата се повлиява добре при лечение с комбинацията от кортикостероиди и дългодействащи бронходилататори.

ХОББ

Този инхалатор се използва за лечение на симптомите на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) при възрастни пациенти. ХОББ е продължително заболяване на дихателните пътища на белите дробове, което обикновено се предизвиква от тютюнопушене.

Астма

Този инхалатор може да Ви бъде предписан по два различни начина:

а) за ежедневна употреба за лечение на Вашата астма, заедно с отделен "облекчаващ" инхалатор за лечение на внезапно влошаващи се симптоми на астмата, като учестяване на дишането, хрипове и кашлица.

б) за ежедневна употреба за лечение на Вашата астма, както и употреба на този инхалатор за лечение на внезапно влошаващи се симптоми на астмата като учестяване на дишането, хрипове и кашлица.

ХОББ

За симптоматично лечение на ХОББ с чести обостряния и изразени симптоми. Дневната доза е две впръсквания сутрин и две впръсквания вечер.